

antibiotická rezistencia

Baktérie odolné voči antibiotikám, známe ako „superbaktérie“, si denne vyžadajú život takmer 90 ľudí v EÚ/EHP. Keďže antibiotiká sú v dôsledku vývoja a šírenia odolných infekcií stále neúčinnjšie, dokonca aj malé chirurgické zákroky a rutinné operácie sa môžu stať život ohrozujúcimi vysoko rizikovými postupmi. Obmedzenie zbytočného používania antibiotík pomáha zastaviť šírenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR). Ak nepríde k zmene, môžu nás ohroziť infekcie, ktoré na antibiotiká nebudú reagovať.

**TREBA OKAMŽITE KONAŤ
AKO SA TO TÝKA VÁS
AKO ZUBNÉHO LEKÁRA?**

Dentálny tím je zodpovedný za 10% preskripcií na antibiotiká. Výskumy ukazujú, že až 80% týchto lekárskeho predpisov bolo nevhodných. Je nevyhnutné uplatňovať zodpovedný prístup k antibiotikám. Zubní lekári by mali poznať národné usmernenia týkajúce sa predpisovania liekov.* Predpisovať mimo týchto usmernení by mali len v odôvodnených prípadoch.

**ANTIBIOTIKÁ BOLEŠŤ ZUBA
NELIEČIA.
DENTÁLNA LIEČBA ÁNO.**

Proti antibiotickej rezistencii bojujte
prevenciou zubného kazu.




Menej
zubného kazu



Menej infekcie



Menej užívania
antibiotík



Menej antibiotickej
rezistencie



Všetky cukry môžu
spôsobovať zubný kaz.



Fluoridy môžu pomôcť
prevencii zubného kazu.



Antibiotiká bolesť zuba NELIEČIA.

Úľavu od bolesti možno najlepšie dosiahnuť dentálnym zákrokom, nie lekárskeho predpisom.

*Tam, kde nie sú k dispozícii miestne usmernenia, odvolajte sa na:

<https://www.fdiworlddental.org/resource/fdi-white-paper-essentials-1-role-of-dental-team-reducing-antibiotic-resistance>

Ak sa rozhodnete predpísať antibiotiká:

- indikácie by mali byť založené na medicínskych dôkazoch
- podávajte antibiotikum s čo najužším spektrom pôsobenia počas najkratšieho možného obdobia
- určite správne dávkovanie i dĺžku užívania
- ak je to možné, podávajte len jedno antibiotikum
- poučte pacientov, aby antibiotiká užívali presne podľa lekárskeho predpisu
- informujte o rizikách spojených s užívaním antibiotík a o šírení rezistentnej infekcie

Zubnú infekciu je najlepšie liečiť zubným zákrokom. Antibiotiká sú indikované iba vtedy, ak je dentogénna infekcia sprevádzaná horúčkou, malátnosťou alebo systémovými príznakmi, ako je opuch, lymfadenopatia, trismus. Pacient s príznakmi sepsy by mal byť ihneď odoslaný na klinické pracovisko.

Prevencia infekcie

Vykonávajte účinnú prevenciu a kontrolu infekcie (hygiena rúk, sterilizácia nástrojov).

Pomáhajte pacientom predchádzať tvorbe zubného kazu a ochoreniam ďasien.



Vyrobil: CED/ERO Spoločná pracovná skupina